

¿Cuándo utilizar CYTOPOINT.®?

Alivio eficaz a largo plazo




Dueños que buscan un
tratamiento mensual fácil



Dificultad para administrar
medicamentos en ciertos perros



Perros que no responden
a otros tratamientos



Se puede administrar a
perros de todas las edades



Dueños que prefieren un
abordaje no farmacológico




Se puede administrar con
muchos medicamentos
comunmente utilizados




Puede utilizarse sin los efectos
colaterales de otros
medicamentos



Enfermedades concomitantes
que no permiten el uso de
otras terapias



Alergias estacionales



Crisis alérgicas a pesar
de otras terapéuticas



Perros en pensión

CYTOPOINT®

Un inyectable en sus manos que provee un control duradero de la dermatitis atópica canina

CYTOPOINT® es una inyección para el tratamiento de dermatitis atópica en su clínica y que se puede usar de forma complementaria

- Cytopoint (Inmunoterapéutico para dermatitis atópica canina) está disponible en presentaciones de 1 vial de 20 mg y 30 mg.
- para ser administrado en su clínica
- inyección subcutánea a la mínima dosis de 2 mg/kg de peso corporal de acuerdo a la indicación de prospecto
- repetir la administración cada 4 a 8 semanas según necesidad individual del paciente
- puede ser administrado a perros de todas las edades



PRECISO

Es preciso, neutraliza la interleuquina (IL)-31, una citoquina clave en la inducción del prurito en la dermatitis atópica¹



ACCIÓN RÁPIDA Y PROLONGADA

Comienza a actuar dentro de las 24 horas y brinda alivio de los signos clínicos de la dermatitis atópica por 4-8 semanas* en una sola inyección asegurando el cumplimiento del tratamiento



SEGURO

Puede ser administrado a perros de todas las edades, incluso aquellos con enfermedades concomitantes, y puede utilizarse junto con muchos medicamentos.



CYTOPOINT® brinda un rápido y eficaz alivio que ayuda a mejorar la calidad de vida a largo plazo tanto de los perros con dermatitis atópica como la de su familia

¹ Gonzales AJ, Humphrey WR, Messamore JE, et al. Interleuquina-31: su rol en el prurito canino y en la dermatitis atópica canina de origen natural.

*Repetir la administración cada 4 a 8 semanas según la necesidad individual de cada paciente.